

Сургутский Евгений Денисович

Психологические драйверы общественной опасности лиц, признанных невменяемыми

АННОТАЦИЯ

В рамках выпускной квалификационной работы «Психологические драйверы общественной опасности лиц, признанных невменяемыми» исследовалась взаимосвязь ранних дезадаптивных схем и дисфункциональных режимов их функционирования со степенью общественной опасности лиц, признанных невменяемыми. Проблема исследования – остаётся неизученной валидность использования клинико-психологических методов в рамках экспертизы общественной опасности лиц, признанных невменяемыми. Общественная опасность и её психологические драйверы являются объектом и предметом исследования соответственно. У 58 пациентов-мужчин Санкт-Петербургской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением в возрасте от 18 лет до 61 года изучались: уровень выраженности ранних дезадаптивных схем (опросник выраженности ранних дезадаптивных схем «Young Shema Questionnaire» – «YSQ-S3R», Young, J., 2014, пер. П.М. Касьяник); выраженность режимов функционирования схем (опросник режимов схем «Schema Mode Inventory» – «SMI», Young, J., 2014, пер. П.М. Касьяник); степень общественной опасности (руководство оценки риска насилия «Historical Clinical Risk Management Scales» второй версии – «HCR-20 V2», Webster K. et al., пер. В.В. Ручкин).

Результаты, полученные при помощи рангового коэффициента корреляции Спирмена с поправкой на множественную проверку гипотез Бенджамини-Хохберга, позволяют судить о слабой, но надёжной взаимосвязи между ранней дезадаптивной схемой «Недостаточность самоконтроля» и степенью общественной опасности лиц, признанных невменяемыми. Таким образом, неподконтрольность поведенческих и эмоциональных реакций, низкая толерантность к фрустрации, неразвитые навыки самодисциплины, целеполагания и планирования, в совокупном взаимодействии могут рассматриваться в качестве потенциального психологического драйвера общественной опасности лиц, признанных невменяемыми.

Проведённое исследование является первым на русском языке. Его дизайн и процедура разработаны в результате теоретического анализа современных научных публикаций из областей судебной психиатрии, клинической психологии, юриспруденции. Представляется важной репликация исследования для проверки воспроизводимости результатов.